

Velice stručný návod k léčbě civilizačních nemocí

Zde jsou shrnuty moje mnohaleté poznatky k úspěšné léčbě rakoviny a v podstatě i všech civilizačních nemocí. Zahrnul jsem sem všechny doporučované postupy při tom nejideálnějším postupu. Je mi jasné, že ne každý si může dovolit nebo je schopen a ochoten absolvovat vše. Pokud se ale dodrží buď vše, nebo alespoň většina, léčba je opravdu velmi efektivní a poměrně rychlá. Už po 2 týdnech začnete pozorovat výsledky na sobě a po měsíci budou už i u lékařů značně měřitelné

Co je rakovina (a v podstatě všechny civilizační nemoci) nastudujte [ZDE](#) a [ZDE](#)

Úkolem celé léčebné a očistné terapie je:

1. **Odkyselit a vyčistit** vnitřní prostředí organismu (buněčný a mezibuněčný prostor) od organických a anorganických patogenů a hlavně kyselin!!! A nastolit normální a acidobazické prostředí organismu. Nejdůležitější je přestat zanášet tělo všemi jedy, cukrem a bílou moukou a zbavit se plísní, parazitů a kvasinek, které do nás vylučují mykotoxiny, kyseliny a neurotoxiny. Nasytit a nasáknout úplně celé tělo Todicampem (lékárenský petrolej s výluhem z ořešáku), který nám pomůže tělo odkyselit....
2. **Znovu vyživit** organismus a to hlavně organickými minerály, které jsou již téměř vyčerpané, neustálou snahou organismu o neutralizaci kyselin a jedů.
3. **Navýšit vibrace** fyzického i energetických těl

Očista organismu (opět zdůrazňuji, že se jedná o neefektivnější postup. Někteří lidé možná některé procedury nemohou nebo nechtějí z různých důvodů absolvovat. Ale popíši prostě ten nejideálnější stav)

Hlavní účel - co nejvíce nasytit organismus, tkáně, orgány, kosti, střevo apod. lékařským petrolejem s ořešákem - Todicampem. Co nejrychleji a neefektivněji odvézt z těla zbytky mrtvých plísní, kvasinek, parazitů a rozpuštěných usazenin, které Petrolej pozabíjí a rozpustí.

- ✓ Přestat okamžitě a nekompromisně zanášet organismus kyselinami a jedy. Určitě alespoň po dobu léčby. Vše popsáno [ZDE](#)
- ✓ Začít čistit zanešený organismus. Vše popsáno srozumitelně [ZDE](#)
- ✓ Kompletní materiál k očištění ke stažení [ZDE](#)
- ✓ Očista střeva Hydrocolon terapií nebo [domácími klystýry](#) (popis metody Hydrocolon terapie [ZDE](#) – již je v každém větším městě)
- ✓ 2x týdně sauna, infra sauna, pára. Velmi účinně odstraňuje znečištěné tělní tekutiny s kyselinami a toxiny a nahradí a doplní novou a čistou tělní tekutinou.
- ✓ 1x týdně lymfatické masáže nebo alespoň nějaké masáže celého těla – určitě najdete někde poblíž. Případně pobyt ve výřivce.
- ✓ Zpočátku každý den 1 – 3 hodiny odkyselovací koupele v [MeineBase](#). Popsáno [ZDE](#) . Po 14 dnech 3-4 týdně alespoň 40 minut.
- ✓ ZeolithMed k odvodu toxinů ze střeva [ZDE](#)
- ✓ Doplnění zdravých bakterií do střeva japonskými [probiotiky OMX](#)
- ✓ Očista a podpora jater [ostropestřecovou pastou](#) 3-4 lžičky denně
- ✓ 1-3x denně 0,25 l vodu obohacenou vodíkem z [generátoru vodíku](#) nebo kupovanou Aquastaminu
- ✓ 1-3 denně odkyselovací čaj 7x7 [KrauterTea](#)
- ✓ 1-3 čajové lžičky jedlé sody s javorovým sirupem [návod ZDE](#)

- ✓ **Lékárenský petrolej Todicamp přesně podle návodu** – několika násobně urychlí a zefektivní očistu těla. To právě Todicamp zabíjí „to“, co do nás vylučuje jedovaté výměšky a hlavně kyseliny, a proti tomu se pak tělo a imunitní systém brání nekontrolovatelným množením buněk. Návod na jednotlivé nemoci zašlu na požádání z emailu info@foxylife.cz Veškeré informace je potřeba znát jako básničku a opravdu velice důkladně prostudovat www.lekarenskypetrolej.cz . Zkušenosti říkají, že nemoci odcházejí po 3-4 lahvičkách Todikampu. Samozřejmě podle váhy člověka a podle toho, jestli se dělají i obklady, mikroklyzmata, potírání, apod. Pak je potřeba 4-7 lahviček.
- ✓ Objednat z Moldávie Apramar – vitamín b17 <https://todicamp.com/product/apramar>. Nejlépe napsat email na office@todicamp.com, můžete i mým jménem (anglicky nebo rusky, klidně [překladačem](#)). Oni už přesně ví, jak sem balíček zaslat, aby ho celníci nevrátili zpět. Na jednu kúru popsáno [ZDE](#) potřebujete 5 krabiček.

Vyživení organismu

- ✓ 3x denně 1-2 ampulky [mořské plazmy](#)
- ✓ 3x denně 1-2 lžičky rostlinného granulátu [WurzelKraft](#)
- ✓ 1x vrchovatá čajová lžička denně organické síry [FOXYMSM](#)
- ✓ 3x denně [Mladý ječmen](#) a [Chlorellu](#) podle návodu dávkování
- ✓ Co nejvíce zeleniny a [zeleninových šťáv](#) (ne ovocných, kvůli cukru)
- ✓ 2-3 litry a více čisté, nejlépe vlažné vody denně
- ✓ Různé bylinkové čaje dle chuti

Navýšit vibrace a očistit energetická těla

- ✓ Navýšit vibrace [ZDE](#)
- ✓ Očista energetických těl na [křišťálové posteli](#)
- ✓ Očista energetických těl a karmických zátěží apod. [ZDE](#) Telefonní kontakt zašlu na požádání

Je jasné, že ne každý může do sauny. Ne každý si chce čistit střevo. Přestat úplně jíst maso apod. Ale kdo chce změnu z Nemoci ke zdraví, musí samozřejmě udělat změnu. A alespoň po dobu léčby vystoupit ze své komfortní zóny a vzdát se oblíbeného. A naopak přidat neoblíbené a do té doby nepředstavitelné.

Ještě se mi nestalo, aby klient, který dodržoval výše uvedené postupy se neuzdravil, prakticky z jakékoliv nemoci (samozřejmě hovořím i o rakovině). Pokud samozřejmě už nepřišel s fyzickým tělem úplně zničeným chemoterapií nebo ozařováním. Tam už není opravdu někdy cesty zpět.

UŽÍVÁNÍ A APLIKACE TODIKAMPU

Sodoterapie (při prevenci není nutná) :

Ráno nalačno 1/2 čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody (lepší vařící vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů a vypijeme. V průběhu dne pijeme sodu mezi příjmem jídla, 30 minut před jídlem, nebo 1 hodinu po jídle. V žaludku nesmí být strava, tzn. nesmí zde docházet k trávicímu procesu. Užívat až 3x denně.

Mikroklyzmy (u preventivního užívání není nutné):

3 ml extraktu Todikamp zpočátku smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo dýňového oleje a zavést do konečníku. 3ml je asi 30 kapek (1/2 čajové lžičky). Celkových 6ml je jedna zarovnaná čajová lžička. Množství oleje se může postupně snižovat, až po 5-7 dnech používáme samotný Todikamp. Každodenní procedúra.

Nejllepší koupit ve zdravotnických potřebách balónek na mikroklyzmata. Balonek lehounce zmačknout a pustit, aby se nasála opravdu jen tekutina ze lžičky. Ve svislé poloze zavést asi 2 cm do konečníku a zase jen zlehka zmačknout, aby se vytlačila všechna tekutina, ale nefoukali jsme tam zbytečně vzduch. Můžeme samozřejmě různě improvizovat. Hlavně nějak Todikamp dostat do konečníku.

Externí aplikace:

Potírat a vtírat oblast jater 2x denně – nevelké množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání. Játra je potřeba v době detoxikace hodně podporovat a očišťovat.

Každodenní zábaly na problematickou oblast:

Zábal:

Čistou gázu o rozměru dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na **pokožku problematické oblasti**. Na gázu přiložit zábalový papír (pauzovací, pečící) a na to přiložíme ještě prodyšnou hrubou tkaninu, např. froté ručník. Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem.

Každodenní procedúra.

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách podél páteře a rovněž na chodidla ze spodu. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční zóny.

Vnitřní příjem:

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A pokračujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle.

Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 1:3 (1 lžička Todikampu a 3 lžičky-polévková lžíce oleje), nebo po užití Todikampu zajist polévkovou lžící nějakého za studena lisovaného oleje. **Pokud budete zapíjet vodou, budete pořád cítit petrolej.**

Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od Todikampu) a užívat nějaký jíl (křemelinu) na pročištění střev a odvádění škodlivých a toxických látek z těla. Za tímto účelem A. Todika vyrábí Zeolit Sorbolit detox, který lze také zakoupit www.foxylife.cz

Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kúru, kterou můžeme začít už na 25-30ti kapkách.

V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika.

V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE.

V případě podávané slabé chemoterapie v tabletách lze kombinovat společně.

Skladovat nejlépe na temném a chladném místě (možno ale i při pokojové teplotě).

Angína

Angína čili **tonzilitida** je zánět krčních mandlí. Jedná se o onemocnění bakteriálního, virového, nebo také mykotického původu. Šíří se formou kapénkové infekce. Angína je běžné onemocnění a v případě bakteriálního původu je dobře léčitelná antibiotiky. Její inkubační doba je 1–3 dny.

Angína znamená v překladu svíravá bolest (z latinského slova angere = svírat)

Vnitřní příjem:

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A pokračujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle.

Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 1:3 (1 lžička Todikampu a 3 lžičky-polévková lžíce oleje), nebo po užití Todikampu zajist polévkovou lžící nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete zapíjet vodou, budete pořád cítit petrolej (ze začátku užívání)

Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od Todikampu) a užívat nějaký jíl (křemelinu) na pročištění střev a odvádění škodlivých a toxických látek z těla.

Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kúru, kterou můžeme začít na 25-30ti kapkách.

Vnější aplikace:

Jednoduchými pohyby prstů vtírat extrakt TODIKAMP® do oblasti krku – zaměřte se zejména na oblast mandlí, vtírat 3 - 4 krát denně.

V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika.

Skladovat nejlépe na temném a chladném místě (možno ale i při pokojové teplotě).

Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi.
Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

Zánět močového měchýře

Vnitřní příjem:

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A pokračujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle.

Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 1:3 (1 lžička Todikampu a 3 lžičky-polévková lžíce oleje), nebo po užití Todikampu zajist polévkovou lžící nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete zapíjet vodou, budete pořád cítit petrolej.

Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od Todikampu) a užívat nějaký jíl (křemelinu) na pročištění střev a odvádění škodlivých a toxických látek z těla.

Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou můžeme začít na 25-30ti kapkách.

Externí aplikace:

Potírat a vtírat v oblasti močového měchýře 2x denně – nevelké množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání.

Každodenní zábaly na postiženou oblast močového měchýře:

Zábal:

Čistou gázu o rozměru dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na **pokožku problematické oblasti**. Na gázu přiložit zábalový papír (pauzovací, pečící) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, např. froté ručník. Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem.

Každodenní procedúra.

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční zóny.

V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika.

V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE.

V případě podávané slabé chemoterapie v tabletách lze kombinovat společně.

Skladovat nejlépe na temném a chladném místě (možno ale i při pokojové teplotě).

Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi.
Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

POLYPY – STŘEVA A ŽALUDEK

Polypy GIT (gastrointestinální trakt, neboli trávicí soustava)- abnormální růst sliznic orgánů gastrointestinálního traktu. Oblast rozšíření není omezena - na celé cestě se mohou objevit výrůstky od konečníku až po hrdlo hltn.

Vnitřní příjem:

Příjem začínáme na 9 kapkách 3x denně, přičemž každý den zvyšujeme dávku o 2 kapky. Takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy) a v tomto objemu pokračujeme s četností 3x denně.

Preparát užíváme 30 minut před jídlem, nebo nejméně 1 hodinu po jídle.

Je vhodné jej smíchat s dýňovým nebo konopným olejem v poměru 3:1 (3 díly extraktu na 1 díl oleje).

Tato kúra trvá 2 měsíce. Poté je třeba učinit přestávku na 6-8 dní a lze zahájit druhou kúru. Tato již může začínat na 15 kapkách.

Externí aplikace:

Nanést a vetřít do problematické oblasti (žaludku, střeva) 2 x denně .

Extrakt vmasírujeme do pokožky až do úplného vstřebání.

Každodenní zábaly na problematickou oblast .

Zábaly:

Čistou gázu o velikosti dlaně přeložíme na 4x a navlhčíme Todikampem (max. 1 čajovou lžičkou) a přiložíme na problematickou oblast. Navrch gázy dáme papírovou vrstvu (pauzovací, pečící papír) a na ni přiložíme silnou tkaninu (např. Frote ručník). Ponecháme 20-30 minut a po této době zábal sejmeme.

Pokožku poté ošetříme olivovým krémem (hydratačním krémem).

Každodenní procedura.

Kromě tohoto se doporučuje potírat chodidla a oblast zad, resp. po obou stranách od páteře malým množstvím Todikampu. Tímto aktivujeme činnost veškerých vnitřních orgánů, neboť zde mají své projekční zóny.

Nedoporučuje se užívání antibiotik v období užívání Todikampu.

Skladujeme v temnu a chladu (lze při pokojové teplotě).

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské postupy.
Pro oficiální lékařskou konzultaci se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

PROBLÉMY S PROSTATOU

Typickými příznaky adenomu jsou:

- potíže s močením;
- bolest ve slabinách;
- problémy s erekcí nebo předčasná ejakulace;
- bolestivé pocity při vypouštění semenné tekutiny;
- přítomnost krve nebo hnisu v moči.

Příznaky nezhooubného zbytnění prostaty:

- časté močení během dne
- časté močení v noci
- urgentní močení (přichází na člověka náhle)
- unik moči
- zpožděný start močení
- slabý proud moči
- přerušované močení
- muž při močení musí tlačit
- samovolné odkapávání moče po vymočení
- nemožnost vymočit se

Mikroklyzmy:

3 ml extraktu Todikamp zpočátku smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo dýňového oleje a zavést do konečníku. 3ml je asi 30 kapek (1/2 čajové lžičky). Celkových 6ml je jedna zarovnaná čajová lžička. Množství oleje se může postupně snižovat, až po 5-7 dnech používáme samotný Todikamp. Každodenní procedura. Nejlepší koupit ve zdravotnických potřebách balónek na mikroklyzmata. Balonek lehounce zmačknout a pustit, aby se nasála opravdu jen tekutina ze lžičky. Ve svislé poloze zavést asi 2 cm do konečníku a zase jen zlehka zmačknout, aby se vytlačila všechna tekutina, ale nefoukali jsme tam zbytečně vzduch. Můžeme samozřejmě různě improvizovat. Hlavně nějak Todikamp dostat do konečníku.

Vnitřní příjem:

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). Například muž 80kg – VDD je 40 kapek. A pokračujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle.

Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 3:1 (3 díly Todikampu a jeden díl oleje), nebo po užití Todikampu zajistit polévkovou lžičkou nebo lžící nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete ihned zapíjet vodou, budete pořád cítit nepříjemnou chuť podobnou petroleji. Proto se doporučuje právě olej.

Doba užívání: 2 měsíce, a pak dát pauzu 8 - 10 dní před zahájením další kúry pokud je to nezbytné. Po přestávce můžete začít užívat již od 20ti kapek.

Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od Todikampu) a užívat nějaký jíł (křemelinu) na pročištění střev a odvádění škodlivých a toxických látek z těla.

Vnější aplikace

Zábal:

Čistou gázu o rozměru menší dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na **pokožku problematické oblasti**. Na gázu přiložit zábalový papír (např. pečící) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, např. froté ručník. Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem.

Dvakrát denně, vtírat extrakt TODIKAMP® do oblasti ledvin, třísel a nadledvinek.

Každodenní procedúra.

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční zóny

Nedoporučujeme používání antibiotik v období aplikace TODIKAMP® extraktu.

Skladovat na tmavém chladném místě (může být při pokojové teplotě).

Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi. Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

VYHŘEZNUTÍ MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY

Externí aplikace:

Dělat zábal na oblast problematického obratle každodenně a vmasírovat Todikamp 2 x denně.

Zábal:

Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou do 4 vrstev navlhčit Todikampem (ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na oblast postiženého orgánu. Navrch gázy přiložit papír – pauzovací, pečící... a na něj přiložit silnou tkaninu, např. Froté ručník.

Ponechat 20 minut a sejmout.

Pokožku namazat olivovým krémem (jakýkoliv hydratační – bez chemických konzervantů a přísad).

Doporučuje se 1-2x denně vtírat preparát do oblasti zad, po obou stranách páteře a rovněž na chodidla. Toto aktivuje činnost veškerých vnitřních orgánů, neboť zde mají své projekční zóny.

Vnitřní příjem:

Začínáme příjem na 7 kapkách 3x denně , každý den zvyšujeme dávku o 2 kapky a takto dojdeme až do VDD= Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy).V tomto objemu pokračujeme 3x denně . Příjem se doporučuje 30 minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle.

V případě, že by se dostavil diskomfort,, pozastavíme navyšování kapek na několik dní , zůstaneme pouze u základní dávky a poté zkusíme opět začít navyšovat dávku.

Každopádně jednorázový příjem nesmí překročit VDD!

Preparát ničím neředíme, je vhodné jej zapít lžičkou lněného, konopného, rakytníkového.... oleje.

Kůra trvá 2 měsíce. Poté udělat přestávku na 6-8 dní a pokud je třeba, můžeme zahájit druhou fázi, ve které je možné začít s 15-ti kapkami.

Nedoporučuje se užívat silné psychotropní léky ani nadměrné množství alkoholu.

Důrazně se nedoporučuje v tomto období užívat **antibiotika**.

Skladovat v temnu a chladu. (při pokojové teplotě).

ШПОРЫ ПЯТОЧНЫЕ PATNÍ OSTRUHY

Внутреннее применение

Vnitřní příjem:

Příjem začít se 7 kapkami todikampu, každý den navýšit dávku o 2 kapky – užívat 3x denně. Dojít do vypočtené denní dávky (tzn. 1 kapka todikampu na 2 kg váhy pacienta).

Preparát užívat 30 minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle.

Dostaví-li se diskomfort, přerušit navyšování na pár dní a poté opět začít s navyšováním dávky do VDD. Ta nesmí překročit **jednorázově VDD.**

Preparát ničím neředit, doporučuji zapít lžičkou lněného oleje. Ten uchovávat v lednici !

Kůra : 1 měsíc

Externí aplikace:

Obklad: Gázu o rozměru 7x7 cm navlhčit todikampem (1 čaj. Lžička) a přikládat na paty. Na gázu přiložit pauzovací nebo voskovaný, pečící apod papír (ne polyetylen!) a obléct silné ponožky. Obklad dělat večer na noc. Pokud budete pociťovat silné pálení (hoření v patách), gázu s todikampem odstraňte a ponechte pouze ponožky do rána. Pálení se může projevit pouze u lidí s citlivou pokožkou na patách. Následující den se aplikuje ten samý obklad pouze s urinou.

Obvykle , po takovýchto každodenních a střídavých obkladech (zábalech) se ostruhy vyřeší v průběhu 10-15 dní.

Kromě tohoto , s cílem ochrany organismu, se doporučuje 1-2x denně potřít chodidla a záda, resp. Obě strany od páteře ve vzdálenosti na 1 prst pacienta.

Nedoporučuje se příjem silných psychotropních léků a konzumace alkoholu (nadměrná) v období aplikace todikampu.

Výrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v tomto období.

Uchovávat v temném a chladném (pokojová teplota) místě.

NESPECIFICKÁ ULCEROZNÍ KOLITIDA

Externí příjem:

Zábal:

Čistou gázu o velikosti dlaně, na 4x přeloženou navlhčit Todikampem (ne více, jak 1 čajovou lžičkou) a přiložit na postiženou oblast střev. Na gázu přiložit pečící, voskový nebo pauzovací papír a na to silnou tkaninu, (např. froté ručník). Ponechat 20 minut, po uplynutí této doby vše odstranit a pokožku namazat olivovým krémem. (nebo jakýmkoliv hydratačním).

Každodenní procedúra.

2x denně vmasírovat hnětením Todikamp do postižené oblasti.

Kromě tohoto se doporučuje 1-2 x denně vetřít preparát do oblasti zad, a to po obou stranách od páteře a rovněž na chodidla. Zde se nacházejí projekční zóny vnitřních orgánů a tato aplikace aktivuje veškeré vnitřní orgány.

Vnitřní příjem:

Příjem začínáme na 7 kapkách 3x denně, zvyšujeme každý den o 2 kapky, až dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD=1kapka todikampu na 2kg váhy). V tomto objemu pokračujeme 3x denně vždy 30 minut před jídlem , nebo je-li příjemnější, 1 hodinu po jídle. V případě, že se dostaví jakýkoliv diskomfort či neschopnost dávku navyšovat, na několik dní přestaneme dávku zvyšovat (užíváme 5 kapek), či zcela upustíme od příjmu a zkusíme to opakovat po několika dnech. V každém případě, jednorázová dávka nesmí překročit VDD- Vypočtenou Denní Dávku.

Preparát ničím neředit, je vhodné zapíjet 1 čajovou lžičkou lněného oleje.

Kůra: 2 měsíce. Poté udělat přestávku na 6-8 dní a zahájit druhou kůru, kterou začínáme na 15-ti kapkách.

Nedoporučuje se užívání silných psychotropních léků a nadměrná konzumace alkoholu po dobu užívání Todikampu.

Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik.

Skladovat v temnu a chladu (lze při pokojové teplotě).

Toto doporučení není léčení nebo lékařská praxe. Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

LEUKÉMIE

Содотерапия: **Terapie sodou**

Ráno nalačno ½ lžičky jedlé sody rozpuštěné v troše teplé vody (lepší vařící voda), doléváme studenou vodou do 1 sklenice, aby se teplota dostala na 40-45 stupňů a pijeme. V průběhu dne pít sodu mezi jídly – 30 minut před jídlem, nebo 1 hodinu po jídle. V žaludku nesmí být potrava, nesmí tam probíhat proces trávení. Užívat 3x denně.

Mikroklyzmy: 3 ml extraktu Todikamp smíchat se 3 ml smíchat s dýňovým , nebo rakytníkovým , konopným olejem a zavést do konečníku. Každodenní procedúra.

Externí aplikace:

Dělat každodenně zábaly na oblast jater.

Zábal:

Čistou gázu o velikosti dlaně na 4x přeloženou navlhčit Todikampem a přiložit na kůži v problematické oblasti . Navrch gázi přiložit pečící papír, nebo pauzák a na to hrubou tkaninu (např. Froté ručník). Po 20 - ti minutách zábal odstranit a kůži namazat olivovým krémem nebo hydratačním mlékem. Každodenní procedúra.

Potírat Todikampem oblast jater 2x denně.

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad z obou stran od páteře a rovněž potírat chodidla, neboť toto aktivuje funkci všech vnitřních orgánů.

Vnitřní příjem:

Příjem začít na 9 kapkách 3x denně, navyšovat po 3-4 kapkách každodenně a dojít do Vypočtené Denní Dávky (VDD: 1 kapka extraktu na 2 kg váhy), pokračujeme v tomto objemu 3x denně. Užívat 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. Todikamp je dobré smíchat s dýňovým nebo konopným olejem v poměru 3:1.

Délka příjmu: 2 měsíce, potom udělat 6-8 dní pauzu a začít následující kůru na 15-ti kapkách.

Nedoporučuje se užívat antibiotika v tomto období.

V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat po 3-4 dnech od skončení chemoterapie.

Skladovat na chladném a temném místě (pokojová teplota).

RAKOVINA DĚLOHY, MYOMY DĚLOHY

Vstříkování, tampóny:

1 ml Todikampu smíchat se 2 ml rakytníkového oleje nebo se lněným olejem vpravit do vagíny . Po 3 dnech vyzkoušet pouze 1 ml čistého Todikampu. Můžeme namáčet tampón a vkládat do vagíny. Jen se nebát, Todicamp neublíží...

Každodenní prodedůra.

Mikroklyzmy: 3-5 ml Todikampu smíchat se lněným nebo rakytníkovým olejem (5ml) a zavést do konečníku.
Každodenní procedura.

Externí aplikace: Každodenní obklady na oblast jater a oblast dělohy.

Mazat a vtírat do suprapubické oblasti a také oblasti jater 2x denně -nevelké množství Todikampu nanést na kůži a vetřít do úplného vstřebání.

Kromě toho, se doporučuje preparát vtírat 1-2x denně v oblasti zad po obou stranách páteře a také do oblasti chodidel, neboť se tak velmi aktivuje funkce všech vnitřních orgánů, protože mají projekční zóny jak u páteře , tak na chodidlech.

Vnitřní užití:

Začíná se se 9 kapkami , s navýšením o 4 kapky **každodenně**, dostat se do vypočtené dávky (vypočtená dávka =1 kapka T. na 2 kg váhy) a pokračovat v tomto objemu 3x denně. Příjem 30 minut před jídlem nebo je li to pro pro Vás lepší 1 hodinu po jídle. Pokud by to způsobovalo diskomfort, nebo nebylo možné zvyšovat dávku, přerušit nvyšování na několik dní a poté se pokusit zvyšovat dávku znovu. Ale není možné překročit **jednorázový příjem** vypočtené denní dávky.

Preparát ničím neředit, po užití zapít jednou lžičkou lněného oleje

.Kůra trvá 2 měsíce a potom přerušit na 6-7 dní a začít

druhou kůru. Tato začíná na 15 kapkách.

Neužívat žádné psychotropní léky a nepít alkohol (ve velkém množství).

Neužívat antibiotika v tomto období.

V případě chemoterapie lze začít užívat Todikamp nejdříve 5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE.

Rakovina hrdla

Rakovina hrdla (hrtan) je maligní nádor hrtanu, který je jednou z nejčastějších onkologických onemocnění. Více než 3% diagnóz maligní neoplasie se vyskytuje u karcinomu dlaždicových buněk v krku. Nejčastěji postihuje muže 40-50 let. Jejich procento v onkologii hrtanu dosahuje 95%. Jedním z nejčastějších příčin maligních nádorů je kouření. Patologie je klasifikována podle umístění novotvaru. Nádor se vyvíjí v nadvrstvě, podšívce nebo středním hrtanu (vokální šňůry).

Použití extraktu TODIKAMP®

Mikroklyzma – (klyzmy s malým obsahem tekutiny)

3ml extraktu TODIKAMP® smíchaný s 3ml konopného olej nebo dýňového oleje a zaveďte do konečníku. Každodenní postup. (Lze použít např. výplachovou stříkačku Janett s oušky)

Sodoterapie - Ráno na prázdný žaludek se rozpustí 1/2 čajové lžičky sody v malém množství horké vody (nejlépe vroucí voda), přidá se studená voda na 1 šálek (tak, aby teplota byla asi 40 až 45 stupňů) a vypít. Během dne pít sodu mezi jídly - nejméně 30 minut před jídlem, nebo 1 hodinu po jídle. V žaludku by nemělo být žádné jídlo, to znamená, že by neměl probíhat trávicí proces. Užívejte až 3krát denně.

Vnitřní příjem

Příjem začínáme na 9 kapkách 3x denně. Každodenně navyšujeme dávku o 3_4 kapky a takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). V tomto objemu pokračujeme 3x denně. Užíváme 30 minut před jídlem a nebo min. 1 hodinu po jídle. Je vhodné extrakt užívat s konopným nebo dýňovým olejem v poměru 3:1 (3 díly Todikampu na 1 díl oleje). Tato kúra trvá 2 měsíce. Poté je potřeba udělat 6-8 dní přestávku a můžeme začít s druhou kúrou, přičemž tato může začít na 25 - 30kapkách.

Externí aplikace

Potřít a vmasírovat do oblasti jater a hrdla 2x denně. Vetřeme až do úplného vstřebání.

Každodenní zábaly na problematickou oblast hrdla a oblast jater.

Zábaly

Čistou gázu o velikosti dlaně přeložíme na 4x (do 4 vrstev), navlhčíme Todikampem (1 čajovou lžičkou) a přiložíme na problematickou oblast. Na gázu přiložíme papírovou vrstvu (pauzovací, pečící papír) a na to silnou tkaninu (froté ručník). Ponecháme 20-30 minut a sejmem. Pokožku ošetříme olivovým nebo jiným krémem. Každodenní procedura.

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařský postup. Pro oficiální lékařskou konzultaci se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

Doporučuje se vtírat Todikamp do oblast chodidel a také zad, resp. po obou stranách od páteře. Zde se nacházejí projekční zóny veškerých vnitřních orgánů a tímto aktivujeme jejich činnost.

V tomto období se nedoporučuje užívání antibiotik.

V případě chemoterapie, Todikamp je možné užít nejdříve 4-5 dní po ukončení chemoterapie.

Skladovat v temnu a chladu (lze při pokojové teplotě).

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařský postup. Pro oficiální lékařskou konzultaci se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

RAKOVINA JATER

Sodoterapie:

Ráno nalačno 1/2 čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody (lepší vařící vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů a vypijeme. □ V průběhu dne pijeme sodu mezi příjmem jídla, 30 minut před jídlem, nebo 1 hodinu po jídle. V žaludku nesmí být strava, tzn. Nesmí zde docházet k trávicímu procesu. Užívat až 3x denně.

Mikroklyzmy:

3 ml extraktu Todikamp smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo dýňového oleje a zavést do konečníku. Každodenní procedúra.

Externí aplikace:

Potírat a vtírat oblast jater 2x denně – nevelké množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do úplného vsrřebání.

Každodenní zábaly na oblast jater.

Zábal:

Čistou gázu o rozměru dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit zábalový papír (pauzovací, pečící..) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, např. Froté ručník. Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem.

Každodenní procedúra.

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční zóny.

Vnitřní příjem:

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 2 kapky a dojdeme tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A pokračujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 3:1. Kurz příjmu: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kúru, kterou

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální lékařské vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

můžeme začít na 25-30ti kapkách.

V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika .V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE.

Skladovat v temném a chladném místě (při pokojové teplotě).

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální lékařské vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

RAKOVINA KONEČNÍKU

Микроклизмы:

3-5 ml Todikampu smíchat s 5 ml oleje lněného, konopného, rakytníkového, vřesového nebo třezalkového a zavést do konečníku. □ Každodenní procedúra.

Vnější aplikace:

Zábaly dělat každodenně v následujícím pořadí: oblast jater, oblast křížové kosti.

Zábal: Čistou gázu o rozměru dlaně , složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit zábalový papír (pauzovací, pečící..) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, např. Froté ručník. Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem. Každodenní procedúra.

2x denně mazat a potírat Todikampem ošetřované části.

Doporučuje se 1_2x denně vtírat preparát do oblasti zad po obou stranách od páteře a rovněž chodidla. Zde jsou projekční zóny veškerých vnitřních orgánů.

Vnitřní příjem:

Začínáme s příjmem 7 kapek 3x denně, zvyšovat každodenně o 2 kapky a dojít do VDD=(Vypočtená Denní Dávka= 1 kapka Todikampu na 2kg váhy) a pokračujeme příjem v tomto objemu 3x denně. Užíváme 30 minut před jídlem , nebo je-li to

příjemnější, 1 hodinu po jídle.

V případě dostavení se diskomfortu nebo pocitu, že není možné navyšovat dávku, přerušit zvyšování dávky a po několika dnech zkusit navyšování znovu. V každém případě , **jednorázový příjem nesmí překročit VDD.**

Preparát ničím neředíme, Je dobré zapít jej 1 čajovou lžičkou dýňového, konopného , případně lněného oleje.

Kůra: 2 měsíce , poté přerušit na 6-8 dní a začít následující kůru na 15-ti kapkách.

Nedoporučuje se užívat silné psychotropné léky a alkohol (v nadměrném množství.

Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v tomto období.

V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní po ukončení chemoterapie.

Skladovat v temnu a chladu (pokojová teplota).

Tato doporučení nejsou ani nenahrazují lékařskou konzultaci či lékařskou praxi. Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

RAKOVINA LEDVIN

Použití preparátu Todikamp

Mikroklyzma: (výplachy s malým objemem tekutiny)

3 ml Todikampu smíchat se 3ml dýňového (konopného) oleje a zavést do konečníku. (lze použít Janettovu stříkačku, gumový balonek..)

Každodenní procedura.

Sodoterapie:

ráno na lačno se 1/2 lžičky jedlé sody rozpustí v malém množství teplé vody (vhodnější je horká voda), doplní se do sklenice se studenou vodou (aby teplota byla asi 40 až 45 °) a vypijeme.

Během dne pít sodu mezi jídly - nejméně 30 minut před jídlem, nebo 1 hodinu po jídle. V žaludku by nemělo být žádné jídlo, to znamená, že by neměl probíhat trávicí proces.

Užívejte až 3krát denně.

Vnitřní příjem:

Užívejte, počínaje 9 kapkami třikrát denně a každý den dávku zvyšujeme o 3 - 4 kapky denně. Takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD - 1 kapka TODIKAMP® extraktu na 1 kg hmotnosti pacienta) a pokračujeme v tomto objemu 3x denně.

Přijímáme nejpozději 30 minut před jídlem, nebo ne dříve než 1 hodinu po jídle.

Extrakt může být smíchán s dýňovým nebo konopným olejem v poměru 3:1.(Tzn. 3 díly Todikampu na 1 díl oleje).

Doba užívání - 2 měsíce, poté dát pauzu 4 - 6 dní před zahájením další kúry. Tato kúra může začít s 25 - 30 kapkami.

Externí aplikace:

Namazat a třít oblasti jater a oblast obou ledvin 2 x denně - malé množství extraktu aplikuje na kůži a vetřete až do úplného vstřebání.

Denní zábaly na oblast každé ledviny a oblasti jater.

Zábaly:

Čistou gázu o velikosti dlaně složte do 4 vrstev, navlhčete extraktem TODIKAMP® a aplikujte na kůži v problematické oblasti. Na gázu aplikujte kompresní papír (např. pečící, pauzovací) a silnou tkaninu.(např. froté ručník apod.) Po 20 - 30 minutách sejměte komprese a namažte pokožku olivovým olejem nebo hydratačním krémem. Každodenní postup.

Doporučuje se 1 - 2 krát denně vetřít extrakt TODIKAMP® do oblasti zad po obou stranách páteře, stejně jako na chodidla. Tímto se aktivuje funkce všech vnitřních orgánů, neboť zde mají své projekční zóny. Jak na chodidlech, tak i v oblasti zad.

Během tohoto období **se nedoporučuje užívat antibiotika.**

V případě **chemoterapie** lze extrakt přípravku TODIKAMP® užívat **4 až 5 dní po skončení léčby.**

Uchovávejte na chladném, tmavém místě (při pokojové teplotě).

Toto doporučení nepředstavuje lékařskou radu ani provádění lékařské praxe. Pro oficiální lékařskou pomoc kontaktujte svého lékaře.

RAKOVINA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Sodoterapie:

Ráno nalačno ½ čajové lžičky sody rozmíchané v malém množství horké vody (lepší vařící vody), doléváme studenou vodou do sklenice, aby teplota byla cca 40-45 stupňů) a vypijeme.

V průběhu dne pijeme sodu mezi jednotlivými jídly - 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. V žaludku nesmí být potrava, tzn. nesmí probíhat trávicí proces.

Užívat 3x denně.

Микроклизмы -

3 ml extraktu Todikamp smíchat se 3 ml rakytníkového, dýňového nebo konopného oleje a zavést do konečníku.

Každodenní procedúra.

Externí aplikace:

Namazat a masírovat (vpravit hnětením) oblast jater a oblast močového měchýře. 2x denně malé množství Todikampu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání.

Každodenní zábaly na oblast nočového měchýře a na oblast jater.

Zábal:

Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou do 4 vrstev navlhčit Todikampem a přiložit na problematickou oblast. Na gázu přiložit papír (pečící, pauzovací) a na to přiložit silnou tkaninu, např. Froté ručník.

Po 20-ti minutách zábal sejmout a pokožku namazat olivovým krémem nebo nějakým hydratačním mlékem (bez chemických přísad pokud možno).

Každodenní aplikace.

1-2 x denně vtírat extrakt Todikamp do oblasti zad, po obou stranách páteře a rovněž na chodidla. Zde jsou projekční zóny veškerých vnitřních orgánů a tímto se velice aktivuje jejich činnost.

Vnitřní užití:

Příjem začínáme na 9 kapkách 3x denně, zvyšujeme o 3_4 kapky každý den až dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy pacienta) a pokračujeme v užívání v tomto objemu 3x denně. Příjem extraktu je 30 minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 3:1 (3 díly Todikampu na 1 díl oleje).

Délka kúry: 2 měsíce, po tomto období udělat pauzu 6-8 dní . Poté lze začít další kúru s počátečním počtem kapek 25-30.

V tomto období se nedoporučuje užívání antibiotik.

V případě chemoterapie je možné extrakt Todikamp začít užívat až po skončení chemoterapie a to 4-5 dní od skončení.

Skladovat na chladu a temnu (lze při pokojové teplotě).

Tato doporučení nejsou lékařskou konzultací nebo lékařskou praxí. Pro oficiální lékařskou konzultaci se prosím obraťte na Vašeho ošetřujícího lékaře.

PAK MO3ΓA RAKOVINA MOZKU

VNĚJŠÍ UŽITÍ

Zábal:

Čistou gázu o velikosti dlaně na 4-krát přeloženou zvlhčit todikampem (ne více, než 1 čajovou lžičku) přiložit na oblast jater. Na gázu přiložíme papír (např pečící nebo pauzák) a na to silnou tkaninu (např. Froté ručník).

Ponecháme 20 minut. Poté odstraníme a natřeme kůži hydratačním krémem (např. Olivovým olejem apod.).

Každodenní procedura 2x denně.

2-3 x denně vtírat nevelké množství todikampu na oblast hlavy, zejména věnovat pozornost vtírání do oblasti čela, temene, okolí uší a zátylku, v linii konce lebeční kosti.

Každodenně kapat 2-3 kapky do nosu 3x denně rozředěné s lněným olejem v poměru: na 1 část todikampu 2 části lněného oleje.

Po cca 3 dnech možno zkusit kapat čistý todikamp. Toto může být poněkud bolestivé, nicméně efektivní.

2x denně lehkým kroužením palců vtírat todikamp do oblasti čelistních dutin – je to oblast nad kořenem nosu a obočí, nos a rovněž zprava a zleva od nosu.

Bud'te opatrní a dbejte, aby todikamp nevníkl do očí při potírání kůže.

Doporučuje se:

1-2x denně přípravek vtírat do oblasti páteře z obou stran na tloušťku jednoho prstu od páteře a zároveň potírat plosky nohou, což velmi aktivuje funkci veškerých vnitřních orgánů, nakolik zde mají své projekční zóny.

Vnitřní užití:

Příjem začínáme na 7 kapkách 3x denně a každý den zvyšujeme dávku o 2 kapky. Takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD=1 kapka Todikampu na 2 kg váhy) , v tomto objemu pokračujeme v užívání 3x denně a to 30 min. před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. Preparát ničím neředíme, je vhodné zapít 1 lžičkou lněného oleje.

Doba příjmu: 2 měsíce, poté udělat 8-10 dní pauzu a začít následnou kůru.

Druhá kůra může začít na 15-ti kapkách.

Nedopporučuje se užívat silné psychotropní lékařské látky, nadměrné množství alkoholu **a důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik.**

V případě **chemoterapie**, todikamp lze začít užívat po 5 dnech od skončení chemoterapie.

Udržovat v temném a chladném místě (při pokojové teplotě).

RAKOVINA PÁTEŘE

Sodoterapie:

Ráno nalačno 1/2 čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody (lepší vařící vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů a vypijeme. V průběhu dne pijeme sodu mezi příjmem jídla, 30 minut před jídlem, nebo 1 hodinu po jídle. V žaludku nesmí být strava, tzn. Nesmí zde docházet k trávicímu procesu. Užívat až 3x denně.

Mikroklyzmy: 3 ml extraktu Todikamp smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo dýňového oleje a zavést do konečníku. Každodenní procedúra.

Externí aplikace: Potírat a vtírat do oblasti jater a oblasti páteře 2x denně – nevelké množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání.

Každodenní zábaly na problematickou oblast páteře a oblast jater.

Zábal:

Čistou gázu o rozměru dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit zábalový papír (pauzovací, pečící..) a na to přiložíme ještě silnou tkaninu, např. froté ručník. Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem. Každodenní procedúra.

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční zóny.

Vnitřní příjem:

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 2 kapky a dojdeme tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A pokračujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 3:1. Kurz příjmu: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kúru, kterou můžeme začít na 25-30 kapkách.

Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему лечащему врачу.

V tomto období **se nedoporučuje užívat antibiotika** .

V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE.

Skladovat v temném a chladném místě (při pokojové teplotě).

Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему лечащему врачу.

RAKOVINA PLIC

Externí aplikace:

Dělat každodenně následující obklady na plíce (ze zadní strany – záda) následujícím způsobem: obklad na oblast jater, obklad na spodní část jedné plíce, obklad na horní část téže plíce, obklad na horní část druhé plíce , obklad na spodní část druhé plíce. Vtírat Todikamp do oblasti plic , jak ze strany zad , tak ze strany hrudi a rovněž na oblast jater 2x denně.

Obklad (zábal):

Čistou gázu o velikosti dlaně, na 4x přeloženou navlhčete Todikampem (max. 1 čaj.lžička) a přiložte na problematický orgán či část těla. Přes gázu přiložte papír – pauzovací nebo pečicí (ne polyetylen!) a nato froté ručník. □ Po 20-ti minutách sejměte. Pokožku potřít olivovým olejem či jiným dostupným olejem (rakytníkový, kokosový....) snažit se bez chemického složení.

Kromě toho se doporučuje

1x denně vtírat preparát do oblasti zad , resp. Po obou stranách páteře ve vzdálenosti na tloušťku 1 prstu od páteře a rovněž na chodidla čímž se aktivuje činnost veškerých vnitřních orgánů, neboť zde mají své projekční zóny.

Vnitřní příjem:

Příjem začínáme na 9-tikapkách 3x denně a každý den navýšíme dávku o 2 kapky . Takto pokračujeme do vypočtené denní dávky VDD, což je 1 kapka todikampu na 2 kg váhy pacienta. V tomto objemu pokračujeme v užívání 3x denně.

Todikamp užíváme 30 minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. Nerozředujeme ve vodě. V případě dostavení se diskomfortu, přerušete navyšování na několik dní a poté opět navažte na původní záměr s navýšením dávky do VDD. V každém případě **jednorázový** příjem nesmí převýšit VDD (vypočtenou denní dávku).

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařskou praxi. V případě potřeby lékařské konzultace se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

Doporučuji zapít todikamp 1 lžičkou lněného oleje. Dbát na správné uchovávání lněného oleje!!

Kůra: 2 měsíce, poté udělat přestávku 6-8 dní a začít následující kůru. V této začínáme na 15-ti kapkách.

Nedoporučuje se přijímat silné psychotropní léky ani alkohol v nadměrném množství.

Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v období kůry todikampem

V případě chemoterapie lze začít s aplikací a užíváním todikampu po 4-5 dnech po jejím skončení.

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařskou praxi. V případě potřeby lékařské konzultace se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

RAKOVINA PROSTATY

Rakovina prostaty je nejběžnější "onkologická nemoc". Další názvy: rakovina prostaty, karcinom prostaty (prostata). U rakoviny prostaty se z epitelu alveolárních buněk postiženého orgánu vytvoří maligní tumor. Patologie často postihuje starší muže. Údaje o mortalitě: až 10% pacientů.

Použití extraktu Todikamp®SRL

Mikroklyzmy: (výplachy s malým množstvím tekutiny).

3ml extraktu TODIKAMP® smíchaný s 3ml konopného nebo dýňového oleje a zaveďte do konečníku.

Každodenní procedura.

Sodoterapie - ráno na lačno 1/2 lžičky jedlé sody rozpustíme v malém množství teplé vody (vhodnější horkoá voda), doplní se do jedné sklenice se studenou vodou (aby teplota byla asi 40 až 45 °) a vypijeme.

Během dne pít sodu mezi jídly - nejméně 30 minut před jídlem, nebo 1 hodinu po jídle. V žaludku by nemělo být žádné jídlo, to znamená, že by neměl probíhat trávicí proces.

Užijte až 3krát denně.

Vnitřní příjem:

Příjem začínáme na 9-ti kapkách 3x denně a každý den dávku zvýšíme o 3-4 kapky. Takto dojdeme do Vypočtené denní Dávky (VDD= 1 kapka extraktu na 2 kg váhy pacienta) a v tomto objemu pokračujeme 3x denně.

Jednorázový příjem by nikdy neměl přesáhnout VDD.

Užíváme 30 minut před jídlem a nebo min. 1 hodinu po jídle. Je vhodné

Todikamp smíchat s konopným, nebo dýňovým olejem v poměru 3:1 (tzn. 3 díly Todikampu na 1 díl oleje).

Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat pauzu 4-6 dní a zahájit druhou kůru, přičemž tuto můžeme začít již na 25_30 kapkách.

Externí aplikace:

Namažte a vmasírujte do oblasti jater a do suprapubické oblasti 2x denně - aplikujte malé množství extraktu na kůži a vtírejte až do úplného absorbování.

Denní zábaly v oblasti kokusu a oblasti jater.

Zábaly:

Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou ve 4 vrstvách, navlhčete extraktem TODIKAMP® a naneste na kůži v oblasti problémů. Na gázu aplikujte kompresní papír (pečící, pauzovací) a silnou tkaninu (např. froté ručník). Po 20 - 30 minutách sejměte zábal a namažte pokožku olivovým olejem nebo hydratačním krémem.

Každodenní procedura.

Doporučuje se 1_2x denně vtírat extrakt na chodidla a také na záda, resp. po obou stranách páteře, čímž se aktivuje činnost veškerých vnitřních orgánů. Zde mají své projekční zóny.

Nedoporučuje se užívání antibiotik v tomto období.

V případě **chemoterapie** je možné preparát Todikamp® začít užívat **4-5 dní po ukončení chemoterapie.**

Skladovat v temnu a chladu (pokojová teplota).

Toto doporučení nepředstavuje lékařskou radu ani lékařskou pomoc. V případě potřeby lékařské konzultace se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

RAKOVINA PRSU

Rakovina prsu (zkratka jako rakovina prsu) je maligní novotvar ve struktuře žlázové tkáně prsu. Jedná se o nejčastější onkologické onemocnění u žen.

Aplikace extraktu Todikamp®

- **Mikroklizmata** (výplachy s minimálním množstvím tekutiny)
3 ml Todikampu smíchat s 3 ml s konopným nebo dýňovým olejem a zavést do konečníku.
(Lze použít Janettovu stříkačku).
Každodenní procedura.
- **Sodoterapie**
Ráno nalačno ½ čajové lžičky sody rozmíchat v malém horké vody (nejlépe vařící).
Doléváme do sklenice studené vody tak, aby teplota byla 40-45 st. Celsia a vypijeme. V průběhu dne přijímejte sodu mezi jídly, 30 minut před jídlem a nebo min. 1 hodinu po jídle.
V žaludku nesmí probíhat travicí proces.
Příjem 3x denně
- **Vnitřní příjem**
Příjem začínáme na 9 kapkách 3x denně, každý den navýšíme dávku o 2 kapky a takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD= 2 kapky Todikampu na 1 kg tělesné váhy). V tomto objemu pokračujeme 3x denně.
Příjem extraktu provádíme 30 minut před jídlem a nebo min. 1 hodinu po jídle.
Je vhodné smíchat s dýňovým nebo konopným olejem v poměru 3:1 (3 díly Todikampu na 1 díl oleje).
Užíváme 2 měsíce, poté na 4-6 dní přerušíme příjem a následně začneme 2. kůru. Tato začíná na 25-30 kapkách.
- **Externí aplikace**
Nanést a vmasírovat do oblasti jater a prsu 2x denně.
Malé množství extraktu nanést na pokožku a veřít do úplného vstřebání. Každodenní zábaly na oblast jater a na problematickou oblast prsu/ů.
- **Zábaly:**
Čistou gázu o velikosti dlaně přeložíme na 4x(do 4 vrstev) a navlhčíme Todikampem (1 čajovou lžičkou) a přiložíme na problematickou oblast. Na gázu přiložíme papírovou vrstvu (pauzovací nebo pečící papír) a na ten přiložíme silnou tkaninu(např. froté ručník).
Ponecháme 20_30 minut a sejmem. Pokožku natřeme olivovým olejem. Každodenní procedura.

Doporučuje se 1-2x denně vtírat Todikamp do chodidel a na záda, resp. po obou stranách páteře, neboť se zde nacházejí projekční zóny veškerých vnitřních orgánů a tímto aktivujeme jejich činnost.

V tomto období se nedoporučuje příjem antibiotik.

V případě provádění chemoterapie lze extrakt Todikamp začít užívat nejdříve 4-5 dní po ukončení chemoterapie.

Skladujeme v temnu a chladu (lze při pokojové teplotě).

RAKOVINA SLINIVKY BŘÍŠNÍ (PANKREASU)

Rakovina pankreasu je onkologické onemocnění, při kterém v důsledku mutace zdravé buňky epitelu orgánu nebo jeho kanálů degenerují do maligních. Jedná se o jednu z forem rakoviny s nejnepříznivější prognózou. Pravděpodobnost vzniku maligního nádoru se zvyšuje s adenomem, pankreatitidou, cysty pankreatu

Použití extraktu Todikamp®

Mikroklyzmy:

3 ml extraktu smícháme se 3 ml konopného nebo dýňového oleje a zavedeme do konečníku.

Každodenní procedura.

Sodoterapie:

Ráno nalačno rozpustíme ½ čajové lžičky jedlé sody ve malém množství teplé vody (lepší je vařící) a doléváme do sklenice studené vody tak, aby teplota byla 40-45 stupňů. Vypijeme.

V průběhu dne sodu popijíme mezi jídly, vždy min. 30 minut před a nebo 1 hodinu po jídle. V žaludku nesmí být potrava, resp. nesmí probíhat trávicí proces.

Aplikujeme 3x denně.

Vnitřní příjem:

Příjem začneme na 9-ti kapkách 3x denně a zvyšujeme o 3-4 kapky každý den. Takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg tělesné váhy pacienta) a v tomto objemu pokračujeme v užívání 3x denně.

Přijímáme 30 minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle.

Je vodné extrakt smíchat s konopným nebo dýňovým olejem v poměru 3:1 (3 díly Todikampu na 1 díl oleje).

Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat 4-6 dní přestávku a zahájit druhou část, kde začínáme již na 25-30 kapkách.

Externí aplikace:

Namažte oblast jater a oblast slinivky 2krát denně - nanášejte malé množství extraktu na kůži a vtírejte, dokud není zcela absorbováno.

Denní zábaly na problematické oblasti pankreasu a oblasti jater.

Zábaly:

Čistou gázu o velikosti dlaně, přeloženou na 4x, navlhčíme Todikampem a přiložíme na pokožku v problematické oblasti. Na gázu přiložíme papírový

kompres (pečící, pauzovací papír..) a na to silnou tkaninu (např. froté ručník).Ponecháme působit 20-30 minut a zábal odstraníme. Pokožku namažeme olivovým mlékem nebo jiným hydratačním krémem. Každodenní procedura.

Doporučuje se 1-2 x denně potříť chodidla a oblast zad, resp. po obou stranách od páteře, neboť se tím aktivuje činnost veškerých vnitřních orgánů. (nacházejí se zde jejich projekční zóny).

Nedoporučuje se v tomto období užívání antibiotik.

V případě chemoterapie je možné začít Todikamp užívat 4-6 dní po ukončení chemoterapie.

Skladujte na chladném a temném místě (při pokojové teplotě lze).

Tato doporučení nepředstavují lékařskou pomoc ani lékařskou praxi. V případě potřeby lékařské konzultace se prosím obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

Aplikace externí:

Lehkými pohyby palců vtíráme Todikamp do problematické oblasti štítné žlázy dva až tři krát denně v průběhu prvních 2-3 dní a poté pokračovat 2x denně.

K tomu každodenně 1x dělat kompresy(obklady) na oblast štítné žlázy :

Obklady:

Čistou gázu o velikosti dlaně přeložíme na 4 vrstvy, navlhčíme Todikampem (max. 1 čajovou lžičkou) a přiložíme na postiženou oblast štítné žlázy. Na gázu přiložíme kompresní obklad (voskovaný nebo pauzovací papír) a na to silnou látku (např. froté ručník). Takto ponecháme 20 minut. Po té sejmeme a kůži potřeme (ošetříme) lněným nebo konopným olejem, případně hydratačním krémem, neboť Todikamp vysušuje pokožku.

Doporučuje se mimo výše uvedené 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad - po obou stranách páteře a na chodidla, což velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční zóny.

Vnitřní užití:

Začínáme s užíváním 9 kapek 3x denně , každý den zvýšíme o 3kapky, dokud se nedostaneme na VDD= Vypočtená Denní Dávka(😞 1kapka na 2 kg váhy) a pokračujeme v příjmu o tomto objemu 3x denně.. Užíváme 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. V případě projevení se diskomfortu nebo neschopnosti nezvyšovat dávku, přerušte na několik dní zvyšování dávky a potom zkuste navyšování znovu. V každém případě, jednorázová dávky **nesmí** překročit VDD (Vypočtenou denní Dávku). Přípravek ničím neředit. Doporučuje se “zapít” jednou lžičkou lněného oleje.

Kůra trvá 2 měsíce. Poté udělat 6-8 denní přestaávku a poté je možno začít následující kůru. Tuto můžeme začít na 15 kapkách.

V období užívání Todikampu se nedoporučuje užívání silných psychotropních léků a pití alkoholu (nadměrné).

Výrazně se nedoporučuje užívání chemoterapie a antibiotik.

Skladovat na temném a chladném místě (možno při pokojové teplotě).

RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA

Sodoterapie:

Ráno nalačno ½ čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody (lepší vařící vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů a vypijeme.

V průběhu dne pijeme sodu mezi příjmem jídla, 30 minut před jídlem, nebo 1 hodinu po jídle. V žaludku nesmí být strava, tzn. Nesmí zde docházet k trávicímu procesu. Užívat až 3x denně.

Mikroklyzmy: 3 ml extraktu Todikamp smíchat se 3 ml rakytníkového, dýňového nebo konopného oleje a zavést do konečníku. Každodenní procedúra.

Externí užívání:

Potírat a vmasírovat do oblasti jater a postižené oblasti střeva 2x denně - malé množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání.

Každodenní zábaly na problematickou oblast střeva a na oblast jater.

Zábal:

Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou do 4 vrstev navlhčit Todikampem a přiložit na pokožku v problematické oblasti. Na gázu přiložit pauzovací, nebo pečící papír a nato hrubou tkaninu, např. froté ručník. Ponechat 20 minut, potom sejmout a pokožku namazat hydratačním krémem - např. Olivovým, nebo jakýmkoliv hydratačním. Každodenní procedúra.

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční zóny.

Vnitřní příjem:

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 2 kapky a dojdeme tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A pokračujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 3:1.

Kurz příjmu: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kúru, kterou můžeme začít na 25-30ti kapkách.

V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika .

V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE.

Skladovat v temném a chladném místě (při pokojové teplotě).

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální lékařské vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

РАК ЖЕЛУДКА – RAKOVINA ŽALUDKU

Externí aplikace

Dělat každodenně zábal na oblast žaludku a na oblast jater.
Potírat oblast žaludku a jater 2x denně.

Zábal:

Čistou gázu o velikosti dlaně na 4x přeložit a navlhčit todikampem (max. 1 čajovou lžičkou). Přiložit na postižený orgán, na to přiložit pauzovací nebo pečící papír a navrch např froté ručník. Ponechat 20 minut a odstranit. Natřít pokožku hydratačním krémem, např. olivovým. Nepoužívat kosmetiku s chemickými složkami, tzn. doporučuji bio.

Každodenní procedúra.

Kromě tohoto potírat chodidla a záda, resp páteř po obou stranách od páteře ve vzdálenosti na šířku jednoho prstu. Toto aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť jsou zde projekční zóny všech vnitřních orgánů.

Vnitřní užití :

Příjem začínáme na 7 kapkách 3x denně a každý den zvyšujeme dávku o 2 kapky. Takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD=1 kapka Todikampu na 2 kg váhy) , v tomto objemu pokračujeme v užívání 3x denně a to 30 min. před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. Preparát ničím neředíme, je vhodné zapít 1 lžičkou lněného oleje.

Kurs příjmu – 2 měsíce, poté přestávka 6-8 dní a začít s další kúrou ,kterou začínáme na 15-ti kapkách.

Nedoporučuje se užívání silných psychotropních látek a alkoholu (ve větším množství).

Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v období příjmu todikampu.

V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat nejdříve 4-5 dní od skončení chemoterapie.